

INFORMACIJE O HEPATITIS B



Sta je Hepatitis B?

To je infekcija jetre izazvana virusom Hepatitis B. Devet od deset ljudi oboljelih od Hepatitis B izljeće infekciju i oporave se. Poznato je da 10% ljudi koji dobiju hepatitis B ostaju inficirani do kraja života. To se zove *chronicna infekcija*. Najčešće se nosioci te infekcije zovu *zarazeni*. Zarazeni je osoba koja ima hroničnu infekciju sa hepatitis B virusom i ta osoba ujedno dijagnozi nemora biti bolesna ali on je inficirana i može inficirati druge. Devet od deset novorođenčadi koji dobiju hepatitis B od njihovih majki postaju zarazeni. Djeca koja dobiju hepatitis B u starosti od 1 do 5 godina, 30% do 50% postaju zarazeni. Kod odraslih rizik od zarazenosti je 6% do 10%. Ljudi koji su zarazeni hepatitis B virusom imaju rizik od ciroze (ostecenja jetre), slabljenje jetre i rak jetre.

Sta su simptomi Hepatitisa B?

Vecinom ljudi nemaju simptoma. Ako se simptomi pojave, oni mogu biti blage ili jake muknne, povraćanje, gubljenje apetita, bol u stomaku, zamor, tamna mokraca i zutica (zutilo koze i ociju).

Kad se pojavljuju prvi simptomi?

Ako inficirana osoba oboli, to se desava dvije sedmice do sest mjeseci (prosjek je 8-12 sedmica) od dana kad je inficirana.

Kako se hepatitis B prenosi?

Hepatitis B se prenosi putem seksa i krvi. Možete dobiti hepatitis B ako ste:

- C dijelili injekciju sa inficiranom osobom (injekcija za upotrebu droga)
- C imali nezasticen seks sa inficiranom osobom
- C dosli u kontakt sa inficiranom osobom preko olvorene rane, krvlji ili druge tjelesnac tekućine
- C upotreba zileta, cekvice za zube i drugih licnih stvari koje mogu biti kontaminirane sa krvljju od zarazene osobe
- C novorođenče rodjeno od inficirane majke

Hepatitis B se nemože prenijeti kasljem, kihanjem, rukovanjem, grljenjem, sjedenjem do inficirane osobe ili djeljenjem hrane sa zarazenim.

Kako se zaštiti od Hepatitis B?

- C Vakcina protiv Hepatitisa B, data u seriji od tri vakcine
- C Upotrebom kondoma tokom seksualne aktivnosti
- C Ako sumnjate da ste izlozeni opasnosti da se inficirate, da se odmah obratite doktoru za tretman
- C Preventivni tretmen pri rođenju, može zaštiti novorođenče u skoro 95% ukoliko je majka zarazena

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da nazovete svog doktora.

HEP B BOSNIAN MARCH 2003

Central District Health Department

Communicable Disease
707 N Armstrong Place
Boise, ID 83704
327-8625

Immunizations
707 N Armstrong Place
Boise, ID 83704
327-7450

Valley County
703 N 1st
McCall, ID 83638
634-7194

Elmore County
520 E. 8th
Mtn Home, ID 83647
587-4407